

レジメンコード016005

レジメン名称ポテリジオ併用mLSG15（1コース目）

投与間隔28 日

備考PSL（内服） 40mg/m² day1, 8, 15, 16, 17、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ドキシルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 40 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	250 m L 350 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 016005

レジメン名称 ポテリジオ併用mLSG15（1コース目）

投与間隔 28 日

備考 PSL（内服） 40mg/m² day1, 8, 15, 16, 17、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日 2 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] ポテリジオ点滴静注20mg[5mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード016005

レジメン名称ポテリジオ併用mLSG15（1コース目）

投与間隔28 日

備考PSL（内服） 40mg/m² day1, 8, 15, 16, 17、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日8 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ドキシルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] 注射用サイメリン50mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 60 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 016005

レジメン名称 ポテリジオ併用mLSG15（1コース目）

投与間隔 28 日

備考 PSL（内服） 40mg/m² day1, 8, 15, 16, 17、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日 14 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg（サクシゾン） ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] ポテリジオ点滴静注20mg[5mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード016005

レジメン名称ポテリジオ併用mLSG15（1コース目）

投与間隔28 日

備考PSL（内服） 40mg/m² day1, 8, 15, 16, 17、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日15 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用フィルデシン注3mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 2.4 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [250mL/袋] 後）カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード016005
レジメン名称ポテリジオ併用mLSG15（1コース目）
投与間隔28 日
備考PSL（内服） 40mg/m² day1, 8, 15, 16, 17、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日 16 日目ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード016005

レジメン名称ポテリジオ併用mLSG15（1コース目）

投与間隔28 日

備考PSL（内服） 40mg/m² day1, 8, 15, 16, 17、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日17 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	