

レジメンコード 016006

レジメン名称 ポテリジオ併用mLSG15 (2~4コース目)

投与間隔 28 日

備考 PSL (内服) 40mg/m² day2, 9, 16, 17, 18、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日 1 日目

ページ数：1/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ポテリジオ点滴静注20mg [5mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 016006

レジメン名称 ポテリジオ併用mLSG15 (2~4コース目)

投与間隔 28 日

備考 PSL (内服) 40mg/m² day2, 9, 16, 17, 18、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日 2 日目

ページ数：2/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 40 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 5分	50 m L 1 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	250 m L 350 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 016006

レジメン名称 ポテリジオ併用mLSG15 (2~4コース目)

投与間隔 28 日

備考 PSL (内服) 40mg/m² day2, 9, 16, 17, 18、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日 9 日目

ページ数：3/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 注射用サイメリン50mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 016006

レジメン名称 ポテリジオ併用mLSG15 (2~4コース目)

投与間隔 28 日

備考 PSL (内服) 40mg/m² day2, 9, 16, 17, 18、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日 15 日目

ページ数：4/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒトコルチゾンコハク酸Na100mg (サクシゾン) ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] ポテリジオ点滴静注20mg [5mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	250 m L 1 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 016006

レジメン名称 ポテリジオ併用mLSG15 (2~4コース目)

投与間隔 28 日

備考 PSL (内服) 40mg/m² day2, 9, 16, 17, 18、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日 16 日目

ページ数：5/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用フィルデシン注3mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5分	50 m L 2.4 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 016006

レジメン名称 ポテリジオ併用mLSG15 (2~4コース目)

投与間隔 28 日

備考 PSL (内服) 40mg/m² day2, 9, 16, 17, 18、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日 17 日目

ページ数：6/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 016006

レジメン名称 ポテリジオ併用mLSG15 (2~4コース目)

投与間隔 28 日

備考 PSL (内服) 40mg/m² day2, 9, 16, 17, 18、ポテリジオ投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

病日 18 日目

ページ数：7/7

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	