

レジメンコード 190012

レジメン名称 ICE

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 190012

レジメン名称 ICE

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] アスパラカリウム注 10mEq [10mL/A] 硫酸Mg補正液 1mEq/mL [20mEq/20mL/A] 後) ファモチジン注射用 20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5時間	500 m L 10 m L 8 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注「ハック」 1mg/50mL「HK」 後) リノロサル注射液 2mg (0.4%) [0.5mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 1時間	1 袋 2 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液 100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 5時間	500 m L 60 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注 400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド 1g ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 5時間	500 m L 0.9 g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 190012

レジメン名称 ICE

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 5時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 190012

レジメン名称 ICE

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：4/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] アスパラカリウム注10mEq[10mL/A] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5時間	500 m L 10 m L 8 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 後) リノロサル注射液2mg (0.4%) [0.5mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 1時間	1 袋 2 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト <sup>ド</sup> 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 5時間	500 m L 60 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	

レジメンコード 190012

レジメン名称 ICE

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 5時間	500 m L 0.9 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 5時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 190012

レジメン名称 ICE

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：6/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] アスパラカリウム注10mEq[10mL/A] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5時間	500 m L 10 m L 8 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 後) リノロサル注射液2mg (0.4%) [0.5mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 1時間	1 袋 2 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト <sup>ド</sup> 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 5時間	500 m L 60 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	

レジメンコード 190012

レジメン名称 ICE

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：7/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 5時間	500 m L 0.9 g/m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 5時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 190012

レジメン名称 ICE

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：8/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] アスパラカリウム注10mEq[10mL/A] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5時間	500 m L 10 m L 8 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 後) リノロサル注射液2mg (0.4%) [0.5mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 1時間	1 袋 2 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト <sup>ド</sup> 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 5時間	500 m L 60 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	

レジメンコード 190012

レジメン名称 ICE

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：9/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 5時間	500 m L 0.9 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 5時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 190012

レジメン名称 ICE

投与間隔 28 日

備考

病日 6 日目

ページ数：10/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] アスパラカリウム注10mEq[10mL/A] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 5時間	500 m L 10 m L 8 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 <sup>ハック</sup> 1mg/50mL 「HK」 後) リノロサル注射液2mg (0.4%) [0.5mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 1時間	1 袋 2 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サト <sup>ド</sup> 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 5時間	500 m L 60 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	

レジメンコード 190012

レジメン名称 ICE

投与間隔 28 日

備考

病日 6 日目

ページ数：11/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 5時間	500 m L 0.9 g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間	100 m L 400 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 5時間	500 m L	
— 以下余白 —		