

レジメンコード 190022
 レジメン名称 Ara-C大量療法（80歳以上）
 投与間隔 21 日
 備考 2コース

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg 「武田テバ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 190022
 レジメン名称 Ara-C大量療法（80歳以上）
 投与間隔 21 日
 備考 2コース

病日 2 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パッパ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg 「武田テバ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] シタラビン点滴静注液1g「テバ」 [50mL/瓶] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間	500 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	