

レジメンコード190023
レジメン名称 CBDCA/VCR 導入療法
投与間隔 84 日
備考

病日 1 日目 ページ数：1/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間30分	100 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バ`ッグ`1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 側管 ③終了後、投与開始 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 175 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード190023
レジメン名称 CBDCA/VCR 導入療法
投与間隔 84 日
備考

病日 8 日目 ページ数：2/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間30分	100 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バ`ッグ`1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 側管 ③終了後、投与開始 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 175 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード190023
レジメン名称 CBDCA/VCR 導入療法
投与間隔 84 日
備考

病日 15 日目 ページ数：3/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間30分	100 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バ`ッグ`1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 側管 ③終了後、投与開始 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 175 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード190023
レジメン名称 CBDCA/VCR 導入療法
投与間隔 84 日
備考

病日 22 日目 ページ数：4/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間30分	100 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 側管 ③終了後、投与開始 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 175 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード190023
レジメン名称 CBDCA/VCR 導入療法
投与間隔 84 日
備考

病日 29 日目 ページ数：5/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間30分	100 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バ`ッグ`1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード190023
レジメン名称 CBDCA/VCR 導入療法
投与間隔 84 日
備考

病日 36 日目 ページ数：6/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間30分	100 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後、投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード190023
レジメン名称 CBDCA/VCR 導入療法
投与間隔 84 日
備考

病日 43 日目 ページ数：7/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間30分	100 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 側管 ③終了後、投与開始 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 175 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード190023
レジメン名称 CBDCA/VCR 導入療法
投与間隔 84 日
備考

病日 50 日目 ページ数：8/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間30分	100 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 側管 ③終了後、投与開始 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 175 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード190023
レジメン名称 CBDCA/VCR 導入療法
投与間隔 84 日
備考

病日 57 日目 ページ数：9/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間30分	100 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 側管 ③終了後、投与開始 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 175 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード190023
レジメン名称 CBDCA/VCR 導入療法
投与間隔 84 日
備考

病日 64 日目 ページ数：10/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間30分	100 m L	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 10分	50 m L 1.5 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 側管 ③終了後、投与開始 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 175 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④終了後、投与開始 点滴時間 5分 — 以下余白 —	50 m L	