

レジメンコード 242008

レジメン名称 PAC/BV

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 50 m L 1 瓶 1 管 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 | 250 m L 90 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシマブBS点滴静注400mg「第一三共」[16mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分 | 100 m L 10 m g / kg | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 — | 50 m L | |

レジメンコード 242008

レジメン名称 PAC/BV

投与間隔 28 日

備考

病日 8 日目

ページ数：2/3

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 50 m L 1 瓶 1 管 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 | 250 m L 90 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 — 以下余白 — | 50 m L | |

レジメンコード 242008

レジメン名称 PAC/BV

投与間隔 28 日

備考

病日 15 日目

ページ数：3/3

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分 | 50 m L 1 瓶 1 管 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間 | 250 m L 90 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ベバシマブBS点滴静注400mg「第一三共」[16mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分 | 100 m L 10 m g / kg | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 — | 50 m L | |