

レジメンコード 246001

レジメン名称 KEY/PTX/CBDCA (weekly)

投与間隔 21 日

備考 術前①4コース CBDCA weekly : AUC1.5

病日 1 日目

ページ数：1/3

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                       | <用量>                               | <メモ> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 10分                                                                                             | 50 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>キイトルーダ点滴静注100m g [4mL/V]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 30分                                                                        | 100 m L<br>200 m g                 |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 10分                                                                                             | 50 m L                             |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タペリ」<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管]<br>ポララミン注5mg[1mL/A]<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間 15分 | 1 袋<br>1 瓶<br>1 管<br>1 管           |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間 1時間                                                              | 250 m L<br>80 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚糖液5% [500mL/袋]<br>後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>点滴時間 1時間                                                            | 500 m L<br>0 m g / A               |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑦<br>点滴時間 10分                                                                                             | 50 m L                             |      |
| — 以下余白 —                                                                                                                                                       |                                    |      |

レジメンコード 246001

レジメン名称 KEY/PTX/CBDCA (weekly)

投与間隔 21 日

備考 術前①4コース CBDCA weekly : AUC1.5

病日 8 日目

ページ数：2/3

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                      | <用量>                               | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管]<br>ポラミン注5mg[1mL/A]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 15分 | 1 袋<br>1 瓶<br>1 管<br>1 管           |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 1時間                                                             | 250 m L<br>80 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚糖液5% [500mL/袋]<br>後) カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 1時間                                                            | 500 m L<br>0 m g / A               |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —                                                                            | 50 m L                             |      |

レジメンコード 246001

レジメン名称 KEY/PTX/CBDCA (weekly)

投与間隔 21 日

備考 術前①4コース CBDCA weekly : AUC1.5

病日 15 日目

ページ数：3/3

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                      | <用量>                               | <メモ> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タペリ」<br>後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管]<br>ポラミン注5mg[1mL/A]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 15分 | 1 袋<br>1 瓶<br>1 管<br>1 管           |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 1時間                                                             | 250 m L<br>80 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>大塚糖液5% [500mL/袋]<br>後) カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 1時間                                                            | 500 m L<br>0 m g / A               |      |
| 点滴注射 (D I V)<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —                                                                            | 50 m L                             |      |