

レジメンコード 246002

レジメン名称 KEY/PTX/CBDCA (triweekly)

投与間隔 21 日

備考 術前①4コース CBDCA triweekly : AUC5

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] キイトルーダ点滴静注100m g [4mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 200 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タペリ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液20mg「トーワ」[2mL/管] ボララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	500 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 246002

レジメン名称 KEY/PTX/CBDCA (triweekly)

投与間隔 21 日

備考 術前①4コース CBDCA triweekly : AUC5

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液 20mg 「トーワ」 2mL/管 ポララミン注 5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL 「ホスピール」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 246002

レジメン名称 KEY/PTX/CBDCA (triweekly)

投与間隔 21 日

備考 術前①4コース CBDCA triweekly : AUC5

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射液 20mg 「トーワ」 2mL/管 ポララミン注 5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液 100mg/16.7mL 「ホスピール」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	