

レジメンコード 246003
 レジメン名称 KEY/EC (90)
 投与間隔 21 日
 備考 術前②4コース

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] キイトルーダ点滴静注100m g [4mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 200 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タペリ」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 塩酸エピルビン注50mg「メルク」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分	50 m L 90 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 注射用エンドキサン500mg ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	