

レジメンコード 246301
 レジメン名称 KEY/ABI (KEY/ABI)
 投与間隔 7 日
 備考 day1.43.64 q12w

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] キイトルーダ点滴静注100m g [4mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 200 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ ③の生食以降、フィルターなしのルートを使用 ◆◆アブラキサンはフィルター禁のため◆◆ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイワ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) アブラキサン点滴静注用100mg ○化学療法で実施 ⑤ 1バイアルあたり生食20mLで溶解する。 必要量を生食50mLの空ボトルに入れる。 点滴時間 30分	100 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	