レジメンコード150005
レジメン名称　AP（DEX 9.9mg）
投与間隔　　21 日
備考

病日　　1　日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） 後）ソルアセトＦ輸液[1L/袋] 前日より開始 ○化学療法で実施 ① 点滴時間　4時間	1000 ｍＬ	
点滴注射（ＤＩＶ） 大塚生食注［500mL/B］ ○化学療法で実施 ② 点滴時間　2時間	500 ｍＬ	
点滴注射（ＤＩＶ） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「ﾀｲﾎｳ」 後）デキサート注射液6.6mg［2mL/B］ ○化学療法で実施 ③ ②終了後、投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射（ＤＩＶ） テルモ生食[100mL/袋] 後）ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ④ ③終了後、投与開始 点滴時間 10分	100 ｍＬ 60 ｍｇ/㎡	
点滴注射（ＤＩＶ） 大塚生食注［500mL/B］ 後）シスプラチン点滴静注50mg「ﾏﾙｺ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ④終了後、投与開始 点滴時間　2時間	500 ｍＬ 50 ｍｇ/㎡	
点滴注射（ＤＩＶ） ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間　2時間	500 ｍＬ	

レジメンコード150005
レジメン名称　AP（DEX 9.9mg）
投与間隔　　21 日
備考

病日　　1　日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） ＫＮ１号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間　3時間	500 ｍＬ	
点滴注射（ＤＩＶ） ＫＮ３号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間　3時間	500 ｍＬ	
－　以下余白　－		

レジメンコード150005
レジメン名称　AP (DEX 9.9mg)
投与間隔　　21 日
備考

病日　　2　日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間　30分	50 ｍＬ 1 瓶	
点滴注射（ＤＩＶ） ＫＮ１号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間　4時間	500 ｍＬ	
点滴注射（ＤＩＶ） フィジオ１４０輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間　4時間	500 ｍＬ	
点滴注射（ＤＩＶ） ＫＮ３号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間　4時間	500 ｍＬ	
点滴注射（ＤＩＶ） フィジオ１４０輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間　4時間 －　以下余白　－	500 ｍＬ	

レジメンコード150005
レジメン名称　AP（DEX 9.9mg）
投与間隔　　21 日
備考

病日　　3　日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間　30分	50 ｍＬ 1 瓶	
点滴注射（ＤＩＶ） ＫＮ１号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間　4時間	500 ｍＬ	
点滴注射（ＤＩＶ） フィジオ１４０輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間　4時間	500 ｍＬ	
点滴注射（ＤＩＶ） ＫＮ３号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間　4時間 －　以下余白　－	500 ｍＬ	

レジメンコード150005
レジメン名称　AP（DEX 9.9mg）
投与間隔　　21 日
備考

病日　　4　日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間　30分	50 ｍＬ 1 瓶	
点滴注射（ＤＩＶ） ＫＮ１号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間　4時間	500 ｍＬ	
点滴注射（ＤＩＶ） フィジオ１４０輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間　4時間 －　以下余白　－	500 ｍＬ	

レジメンコード150005
レジメン名称　AP（DEX 9.9mg）
投与間隔　　21 日
備考

病日　　5　日目

＜薬品名・用法＞	＜用量＞	＜メモ＞
点滴注射（ＤＩＶ） ＫＮ１号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間　4時間 －　以下余白　－	500 ｍＬ	