

レジメンコード150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒトコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始1時間後より開始 点滴時間 30分	50 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント <sup>®</sup> 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オクサ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	

レジメンコード 150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 15分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒト <sup>α</sup> コルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg 「AFP」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ② ①開始30分後より開始 点滴時間 30分	50 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ③ ②終了後開始 点滴時間 30分	50 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ ③終了後開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント <sup>®</sup> 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	

レジメンコード 150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「効効」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 15分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg 「AFP」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始1時間後より開始 点滴時間 30分	50 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オキサ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	

レジメンコード 150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 15分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：7/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg 「AFP」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始1時間後より開始 点滴時間 30分	50 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オクサ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	

レジメンコード 150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：8/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 15分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：9/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg 「AFP」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 ①開始1時間後より開始 点滴時間 30分	50 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間30分	500 m L 100 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オクサ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管	

レジメンコード 150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：10/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 15分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 9 日目

ページ数：11/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒトコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸オキソプラミド注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード 150006

レジメン名称 BEP

投与間隔 21 日

備考

病日 16 日目

ページ数：12/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ヒトコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L 20 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 後) 塩酸オキソプラミド注射液10mg「オキサ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間  — 以下余白 —	500 m L 1 管	