備考

病日 1 日目

ページ数: 1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ> 
点滴注射(D I V) ソルアセトF輸液[1L/袋] ○化学療法で実施 ①	1000 mL	
前日の20時より投与開始 点滴時間 12時間		
点滴注射(D I V) ソルアセトF輸液[1L/袋] ○化学療法で実施 ②	1000 m L	
点滴時間 4時間 	 	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後)ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ③	100 m L 1.5 瓶 1 管	
側管 ②投与開始3時間後より開始 点滴時間 30分		
点滴注射 (DIV) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間	500 m L 50 m g/m²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1mg 〇化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	100 m L 0.75 m g/m²	
	l .	

備考

病日 1 日目

ページ数:2/4

<u> </u>		ペーシ数:2/4
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (DIV) ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後) 塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射(D I V) K N 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射(D I V) KN3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 mL	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑨投与開始30分後より開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
一 以下余白 一		

備考

病日 2 日目

ページ数: 3/4

丙日 2 日目		ベージ数:3/4
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 0.75 m g/m²	
点滴注射 (D I V) K N 3 号輸液[500mL/B] 後) 塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射(DIV) KN1号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間 - 以下余白 -	500 m L	

備考

病日 3 日目

ページ数:4/4

柄日   3   日日 		ページ数:4/4
<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ハイカムチン注射用1.1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	100 m L 0.75 m g/m²	
点滴注射 (D I V) K N 3 号輸液[500mL/B] 後) 塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射(DIV) KN1号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間 - 以下余白 -	500 m L	