

レジメンコード150017

レジメン名称 CPT-P

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/7

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|--------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間 | 500 m L 22.5 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間 | 500 m L 10 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸 ^{トコ} プラミド ^ト 注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間 | 500 m L 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分 | 50 m L 0.5 管 | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間 | 500 m L | |
| 点滴注射 (D I V) KN 1号輸液 [500mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 3時間 — 以下余白 — | 500 m L 0.5 管 | |

レジメンコード 150017

レジメン名称 CPT-P

投与間隔 28 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/7

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|--------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間 | 500 m L 22.5 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg 「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間 | 500 m L 10 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸 ^{トコ} プラミド ^ト 注射液10mg 「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間 | 500 m L 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg 「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分 | 50 m L 0.5 管 | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間 | 500 m L | |
| 点滴注射 (D I V) KN 1号輸液 [500mL/B] 後) フロセミド注20mg 「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 3時間 — 以下余白 — | 500 m L 0.5 管 | |

レジメンコード 150017

レジメン名称 CPT-P

投与間隔 28 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/7

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|--|--------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間 | 500 m L 22.5 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間 | 500 m L 10 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸トコプラミド ^注 注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間 | 500 m L 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分 | 50 m L 0.5 管 | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間 | 500 m L | |
| 点滴注射 (D I V) KN 1号輸液 [500mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 3時間 — 以下余白 — | 500 m L 0.5 管 | |

レジメンコード 150017

レジメン名称 CPT-P

投与間隔 28 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/7

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|--------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間 | 500 m L 22.5 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg 「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間 | 500 m L 10 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸 ^{トコ} プラミド ^ト 注射液10mg 「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間 | 500 m L 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg 「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分 | 50 m L 0.5 管 | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間 | 500 m L | |
| 点滴注射 (D I V) KN 1号輸液 [500mL/B] 後) フロセミド注20mg 「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 3時間 — 以下余白 — | 500 m L 0.5 管 | |

レジメンコード 150017

レジメン名称 CPT-P

投与間隔 28 日

備考

病日 5 日目

ページ数：5/7

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|--------------------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間 | 500 m L 22.5 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注10mg 「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間 | 500 m L 10 m g / m ² | |
| 点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸 ^{トコ} プラミド ^ト 注射液10mg 「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間 | 500 m L 1 管 | |
| 点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] 後) フロセミド注20mg 「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分 | 50 m L 0.5 管 | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間 | 500 m L | |
| 点滴注射 (D I V) KN 1号輸液 [500mL/B] 後) フロセミド注20mg 「武田テバ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 3時間 — 以下余白 — | 500 m L 0.5 管 | |

レジメンコード 150017

レジメン名称 CPT-P

投与間隔 28 日

備考

病日 6 日目

ページ数：6/7

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|---------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間 | 500 m L | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間 | 500 m L | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間 — 以下余白 — | 500 m L | |

レジメンコード 150017

レジメン名称 CPT-P

投与間隔 28 日

備考

病日 7 日目

ページ数：7/7

| <薬品名・用法> | <用量> | <メモ> |
|---|---------|------|
| 点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間 | 1 袋 | |
| 点滴注射 (D I V) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間 | 500 m L | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 3時間 | 500 m L | |
| 点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 3時間 — 以下余白 — | 500 m L | |