

レジメンコード 150027

レジメン名称 EA

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイホ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液 [500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150027

レジメン名称 EA

投与間隔 14 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード150027

レジメン名称 EA

投与間隔 14 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150027

レジメン名称 EA

投与間隔 14 日

備考

病日 4 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトボシド点滴静注液100mg 「SN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 60 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		