

レジメンコード 150040

レジメン名称 MEA

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5時間	100 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 側管 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン0.5mg ○化学療法で実施 ③ 側管 点滴時間 5分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 注射用メソトレキセート50mg ○化学療法で実施 ⑥ ⑦投与5分前に投与開始 側管 点滴時間 5分	50 m L 150 m g	

レジメンコード150040

レジメン名称 MEA

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用メソトレキセート50mg ○化学療法で実施 ⑦ ①終了後投与開始 点滴時間 4時間	500 m L 300 m g	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 12時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード150040

レジメン名称 MEA

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5時間	100 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 側管 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン0.5mg ○化学療法で実施 ③ 側管 点滴時間 5分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 MTX投与開始24時間後から12時間毎に投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	

レジメンコード150040

レジメン名称 MEA

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ ①終了後投与開始 点滴時間 7時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 12時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 MTX投与開始24時間後から12時間毎に投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード150040

レジメン名称 MEA

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5時間	100 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 側管 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン0.5mg ○化学療法で実施 ③ 側管 点滴時間 5分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 MTX投与開始24時間後から12時間毎に投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	

レジメンコード150040

レジメン名称 MEA

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ ①終了後投与開始 点滴時間 7時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 12時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管 MTX投与開始24時間後から12時間毎に投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g	

レジメンコード150040

レジメン名称 MEA

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：7/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5時間	100 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 側管 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン0.5mg ○化学療法で実施 ③ 側管 点滴時間 5分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 MTX投与開始24時間後から12時間毎に投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	

レジメンコード150040

レジメン名称 MEA

投与間隔 21 日

備考

病日 4 日目

ページ数：8/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ ①終了後投与開始 点滴時間 7時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 12時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150040

レジメン名称 MEA

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：9/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5時間	100 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② ①と同時に投与開始 側管 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] コスメゲン0.5mg ○化学療法で実施 ③ 側管 点滴時間 5分	50 m L 0.5 m g	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 2時間	500 m L 100 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセトD輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑥ ①終了後投与開始 点滴時間 7時間	500 m L	

レジメンコード150040

レジメン名称 MEA

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：10/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) ソルアセトF 輸液[500mL/袋] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 12時間 — 以下余白 —	500 m L	