

レジメンコード 150042
レジメン名称 MTX (5-days)
投与間隔 14 日
備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>筋肉注射（IM） [外来] 注射用メソトレキセート50mg 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] MTX50mg/Vを注水2mLで溶解する。(25mg/mL) ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>0.4 m g /kg 20 m L</p>	

レジメンコード 150042
レジメン名称 MTX (5-days)
投与間隔 14 日
備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] 注射用メソトレキセート50mg 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] MTX50mg/Vを注水2mLで溶解する。(25mg/mL) ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	0.4 m g /kg 20 m L	

レジメンコード 150042
レジメン名称 MTX (5-days)
投与間隔 14 日
備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] 注射用メソトレキセート50mg 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] MTX50mg/Vを注水2mLで溶解する。(25mg/mL) ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	0.4 m g /kg 20 m L	

レジメンコード 150042
レジメン名称 MTX (5-days)
投与間隔 14 日
備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>筋肉注射（IM） [外来] 注射用メソトレキセート50mg 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] MTX50mg/Vを注水2mLで溶解する。(25mg/mL) ○化学療法で実施 ①</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>0.4 m g /kg 20 m L</p>	

レジメンコード 150042
レジメン名称 MTX (5-days)
投与間隔 14 日
備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
筋肉注射（IM） [外来] 注射用メソトレキセート50mg 注射用水(大塚蒸留水) [20mL/A] MTX50mg/Vを注水2mLで溶解する。(25mg/mL) ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	0.4 m g /kg 20 m L	