

レジメンコード 150060
 レジメン名称 dd-TCB
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL [16mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 点滴時間 1時間30分	100 m L 15 m g / kg	
点滴注射 (D I V) ソルアセットF輸液 [500mL/袋] 後) 塩酸オキサリプラチン注射液10mg「オクサ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 150060

レジメン名称 dd-TCB

投与間隔 21 日

備考 AUC 6

病日 1 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間 — 以下余白 —	200 m L	

レジメンコード 150060
 レジメン名称 dd-TCB
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 6

病日 8 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バ ^ッ ク ^ク 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ ^ー ラ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [200mL/B] 後) 塩酸オキプロラミド ^ト 注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	200 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 150060
 レジメン名称 dd-TCB
 投与間隔 21 日
 備考 AUC 6

病日 15 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [100mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バ ^ッ ク ^ク 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピ ^ー ラ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [200mL/B] 後) 塩酸オ ^ク ロ ^フ ラ ^ミ ド ^ト 注射液10mg「タ ^タ 」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	200 m L 1 管	
— 以下余白 —		