

レジメンコード 150066
 レジメン名称 IFO/CDDP
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 150066
 レジメン名称 IFO/CDDP
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後）塩酸トクロファミド注射液10mg「効タ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 1 管	

レジメンコード 150066
 レジメン名称 IFO/CDDP
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 150066
 レジメン名称 IFO/CDDP
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：4/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後）塩酸トクロファミド注射液10mg「効タ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 1 管	

レジメンコード 150066
 レジメン名称 IFO/CDDP
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：5/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 150066
 レジメン名称 IFO/CDDP
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：6/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後）塩酸トクロファミド注射液10mg「効タ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 1 管	

レジメンコード 150066
 レジメン名称 IFO/CDDP
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：7/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 150066
 レジメン名称 IFO/CDDP
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：8/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後）塩酸トクロファミド注射液10mg「効タ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 1 管	

レジメンコード 150066
 レジメン名称 IFO/CDDP
 投与間隔 21 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：9/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 1.5 g / m ²	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 150066
 レジメン名称 IFO/CDDP
 投与間隔 21 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：10/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）ソルアセトF輸液[500mL/袋] 後）塩酸トクロファミド注射液10mg「効タ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管 ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 300 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 1 管	

レジメンコード 150066
レジメン名称 IFO/CDDP
投与間隔 21 日
備考

病日 6 日目

ページ数：11/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） KN 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード150066
レジメン名称 IFO/CDDP
投与間隔 21 日
備考

病日 7 日目

ページ数：12/12

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射（D I V） K N 1 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射（D I V） フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L	