

レジメンコード150072
レジメン名称 Doxil/CBDCA/BEV
投与間隔 28 日
備考 AUC5

病日 1 日目 ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] アバスタチン点滴静注用400mg/16mL [16mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能 点滴時間 1時間30分	100 m L 10 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 15分	1 袋 1.5 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5%[250mL/袋] ドキシル注20mg [10mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 1時間	250 m L 30 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 2時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード150072
レジメン名称 Doxil/CBDCA/BEV
投与間隔 28 日
備考 AUC5

病日 15 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] アバスチン点滴静注用400mg/16mL[16mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能 点滴時間 1時間30分	100 m L 10 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	