

レジメンコード 120001

レジメン名称 K2 A

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ④ 側管 ⑤の30分前より投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 [100mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	500 m L 120 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセットF輸液 [500mL/袋] アンナカ注「フー」20% [200mg/1mL/A] セレネース注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 1500 m g / m <sup>2</sup> 3 管	

レジメンコード 120001

レジメン名称 K2 A

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	100 m L 30 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B] 後) フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管 ⑨と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 0.5 管	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 4時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 120001

レジメン名称 K2 A

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用 20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ③の30分前より投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L 30 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) ソルアセト F 輸液 [500mL/袋] アンナカ注「フー」20% [200mg/1mL/A] セレネース注 5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 1500 m g / m <sup>2</sup> 3 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L	

レジメンコード 120001

レジメン名称 K2 A

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 4時間	500 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 120001

レジメン名称 K2 A

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用 20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ③の30分前より投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) ソルアセト F 輸液 [500mL/袋] アンナカ注「フー」20% [200mg/1mL/A] セレネース注 5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③と同時に投与開始 点滴時間 24時間	500 m L 1500 m g / m <sup>2</sup> 3 管	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 6時間  — 以下余白 —	500 m L	