

レジメンコード 120002
 レジメン名称 K2 A (カフェイン無し)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L 10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイウ」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ④ 側管 ⑤の30分前より投与開始 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	300 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L 120 m g / m ²	

レジメンコード120002

レジメン名称 K2 A (カフェイン無し)

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) フィジオ140輸液 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ140輸液 [500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN3号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 120002
 レジメン名称 K2 A (カフェイン無し)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ③ 側管 ②と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 120002
レジメン名称 K2 A (カフェイン無し)
投与間隔 21 日
備考

病日 2 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 4時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード 120002
 レジメン名称 K2 A (カフェイン無し)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] メイロン 静注 7% [16. 7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] デキサート注射液 6. 6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用 20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) フィジオ 1 4 0 輸液 [500mL/B] メイロン 静注 7% [16. 7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 6時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 6時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン 静注 7% [16. 7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	