

レジメンコード 120005
 レジメン名称 NECO-95J (CDDP/ADM)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間30分	500 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 3時間	500 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管) ②と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] 後) 塩酸オクロプラミド注射液10mg「オク」[2mL/A] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ハロペリドール注5mg 「ヨシトミ」 [1mL/A] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 2 管 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B] 側管) ④と同時に投与開始 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 5時間	500 m L 120 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管) ⑤終了後開始 点滴時間 1時間	300 m L	

レジメンコード 120005
 レジメン名称 NECO-95J (CDDP/ADM)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ⑦ ⑥終了後開始 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 [2mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ⑧ 側管) ⑦と同時に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑩ 側管) ⑨と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「AFP」 後) ハロペリドール注5mg 「ヨシトミ」 [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ ⑨終了後開始 点滴時間 6時間	500 m L 2 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ⑫ 側管) ⑪と同時に投与開始 点滴時間 3時間	100 m L 30 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 120005
 レジメン名称 NECO-95J (CDDP/ADM)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] 10%塩化ナトリウム注(ソルトン-PL) [34. 2mEq/20mL/A] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 後) ハロペリドール注5mg 「ヨシトミ」 [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L 1 管 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 [2mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「AFP」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 6時間	500 m L 1 管 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ 側管) ③と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] ビタメジン静注用 10%塩化ナトリウム注(ソルトン-PL) [34. 2mEq/20mL/A] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 6時間	500 m L 1 瓶 1 管 1 管	

レジメンコード 120005
 レジメン名称 NECO-95J (CDDP/ADM)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：4/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 [2mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ⑥ 側管) ⑤と同時に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 ○化学療法で実施 ⑦ 側管) ⑥終了後開始 点滴時間 3時間	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「AFP」 ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 6時間	500 m L 1 管 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑨ 側管) ⑧と同時に投与開始 点滴時間 15分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 120005
 レジメン名称 NECO-95J (CDDP/ADM)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：5/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] 10%塩化ナトリウム注(ソルトン-PL) [34. 2mEq/20mL/A] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 後) ハロペリドール注5mg 「ヨシトミ」 [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L 1 管 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 [2mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「AFP」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 6時間	500 m L 1 管 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ 側管) ③と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] ビタメジン静注用 10%塩化ナトリウム注(ソルトン-PL) [34. 2mEq/20mL/A] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 6時間	500 m L 1 瓶 1 管 1 管	

レジメンコード 120005

レジメン名称 NECO-95J (CDDP/ADM)

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：6/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 [2mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ⑥ 側管) ⑤と同時に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「AFP」 後) ハロペリドール注5mg 「ヨシトミ」 [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 6時間	500 m L 1 管 2 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッケ1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑧ 側管) ⑦と同時に投与開始 点滴時間 15分 — 以下余白 —	1 袋	

レジメンコード 120005
 レジメン名称 NECO-95J (CDDP/ADM)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：7/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] 10%塩化ナトリウム注(ソルトン-PL) [34. 2mEq/20mL/A] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 後) ハロペリドール注5mg 「ヨシトミ」 [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L 1 管 1 管 1 管	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 [2mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ② 側管) ①と同時に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「AFP」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 6時間	500 m L 1 管 2 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ 側管) ③と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] ビタメジン静注用 10%塩化ナトリウム注(ソルトン-PL) [34. 2mEq/20mL/A] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 6時間	500 m L 1 瓶 1 管 1 管	

レジメンコード 120005
 レジメン名称 NECO-95J (CDDP/ADM)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：8/8

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」 [2mL/A] ソル・メドロール静注用125mg ○化学療法で実施 ⑥ 側管) ⑤と同時に投与開始 点滴時間 1時間	100 m L 1 管 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 2 号輸液[500mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「AFP」 後) ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 6時間	500 m L 1 管 2 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッケ1mg/50mL「HK」 ○化学療法で実施 ⑧ 側管) ⑦と同時に投与開始 点滴時間 15分 — 以下余白 —	1 袋	