

レジメンコード 120006
 レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L 4 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	300 m L	

レジメンコード 120006
 レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 1200 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 120006
レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
投与間隔 21 日
備考

病日 1 日目

ページ数：3/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード 120006

レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：4/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	300 m L	

レジメンコード 120006
 レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：5/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	

レジメンコード 120006
レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
投与間隔 21 日
備考

病日 2 日目

ページ数：6/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード 120006
 レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：7/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	300 m L	

レジメンコード120006

レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：8/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 2時間 ⑫	500 m L 1 管	

レジメンコード 120006
 レジメン名称 NECO-95J（IFO大量療法）
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：9/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
— 以下余白 —		

レジメンコード 120006
 レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：10/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	300 m L	

レジメンコード 120006
 レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：11/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 2時間 ⑫	500 m L 1 管	

レジメンコード 120006
レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
投与間隔 21 日
備考

病日 4 日目

ページ数：12/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード120006

レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：13/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	300 m L	

レジメンコード120006

レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：14/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 2時間 ⑫	500 m L 1 管	

レジメンコード 120006
レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
投与間隔 21 日
備考

病日 5 日目

ページ数：15/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード 120006

レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)

投与間隔 21 日

備考

病日 6 日目

ページ数：16/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	300 m L	

レジメンコード 120006
 レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 6 日目

ページ数：17/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 2時間 ⑫	500 m L 1 管	

レジメンコード 120006
レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
投与間隔 21 日
備考

病日 6 日目

ページ数：18/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	

レジメンコード120006

レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)

投与間隔 21 日

備考

病日 7 日目

ページ数：19/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「サワイ」 ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	1 袋 1.5 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [500mL/B] 注射用イホマイド1g ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 4時間	500 m L 2 g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg[4mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ④と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 800 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 30分	300 m L	

レジメンコード 120006

レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)

投与間隔 21 日

備考

病日 7 日目

ページ数：20/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 側管 ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 1時間30分	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 2時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ウロミテキサン注400mg [4mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管 ⑩と同時に投与開始 点滴時間 30分	50 m L 600 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] メイロン静注7% [16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 点滴時間 2時間 ⑫	500 m L 1 管	

レジメンコード 120006
レジメン名称 NECO-95J (IFO大量療法)
投与間隔 21 日
備考

病日 7 日目

ページ数：21/21

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 点滴時間 4時間	500 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] メイロン静注7%[16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L 1 管	