

レジメンコード 120007
 レジメン名称 NECO-95J (MTX大量療法)
 投与間隔 7 日
 備考 MTX 8,000～12,000mg/m²

病日 1 日目

ページ数：1/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注 (炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ダイアモックス注射用500mg ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 120007
 レジメン名称 NECO-95J (MTX大量療法)
 投与間隔 7 日
 備考 MTX 8,000～12,000mg/m²

病日 2 日目

ページ数：2/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 6時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 2 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) メソトレキセート点滴静注液1000mg [40mL/B] ○化学療法で実施 ④ ◆◆◆ MTX 8,000～12,000mg/m ² ◆◆◆ 点滴時間 6時間	12000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ダイアモックス注射用500mg ○化学療法で実施 ⑤ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 2 瓶 2 管	

レジメンコード 120007
 レジメン名称 NECO-95J (MTX大量療法)
 投与間隔 7 日
 備考 MTX 8,000～12,000mg/m²

病日 2 日目

ページ数：3/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 4時間	500 m L 40 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 4時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ダイアモックス注射用500mg ○化学療法で実施 ⑨ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑩ 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L 40 m L	

レジメンコード 120007

レジメン名称 NECO-95J (MTX大量療法)

投与間隔 7 日

備考 MTX 8,000~12,000mg/m²

病日 3 日目

ページ数：4/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 4時間	500 m L 40 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 2 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 4時間	500 m L 20 m L	

レジメンコード 120007
 レジメン名称 NECO-95J (MTX大量療法)
 投与間隔 7 日
 備考 MTX 8,000～12,000mg/m²

病日 3 日目

ページ数：5/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ダイアモックス注射用500mg ○化学療法で実施 ⑦ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 2 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 点滴時間 4時間	500 m L 40 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 点滴時間 4時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 2 瓶 2 管	

レジメンコード 120007
 レジメン名称 NECO-95J (MTX大量療法)
 投与間隔 7 日
 備考 MTX 8,000～12,000mg/m²

病日 3 日目

ページ数：6/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑭ 点滴時間 4時間	500 m L 40 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ダイアモックス注射用500mg ○化学療法で実施 ⑮ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
— 以下余白 —		

レジメンコード 120007
 レジメン名称 NECO-95J (MTX大量療法)
 投与間隔 7 日
 備考 MTX 8,000～12,000mg/m²

病日 4 日目

ページ数：7/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L 40 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 2 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッケ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	

レジメンコード120007

レジメン名称 NECO-95J (MTX大量療法)

投与間隔 7 日

備考 MTX 8,000～12,000mg/m²

病日 4 日目

ページ数：8/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ダイアモックス注射用500mg ○化学療法で実施 ⑦ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 4時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 2 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 4時間	500 m L 40 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑫ 点滴時間 4時間	500 m L 20 m L	

レジメンコード120007

レジメン名称 NECO-95J (MTX大量療法)

投与間隔 7 日

備考 MTX 8,000～12,000mg/m²

病日 4 日目

ページ数：9/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「効タ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ⑬ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 2 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑭ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ダイアモックス注射用500mg ○化学療法で実施 ⑮ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液 [500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑯ 点滴時間 4時間 — 以下余白 —	500 m L 40 m L	

レジメンコード 120007
 レジメン名称 NECO-95J (MTX大量療法)
 投与間隔 7 日
 備考 MTX 8,000～12,000mg/m²

病日 5 日目

ページ数：10/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 4時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 4時間	500 m L 40 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タカ」 [2mL/A] ○化学療法で実施 ④ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 2 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッケ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 側管より投与 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ⑥ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 15 m g	

レジメンコード 120007

レジメン名称 NECO-95J (MTX大量療法)

投与間隔 7 日

備考 MTX 8,000～12,000mg/m²

病日 5 日目

ページ数：11/11

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ダイアモックス注射用500mg ○化学療法で実施 ⑦ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 1 瓶	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 4時間	500 m L 20 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ソル・メドロール静注用125mg 後) 塩酸トクロファミド注射液10mg「タタ」[2mL/A] ○化学療法で実施 ⑨ 側管より投与 点滴時間 30分	50 m L 2 瓶 2 管	
点滴注射 (D I V) KN 3 号輸液[500mL/B] 重ソー注(炭酸水素ナトリウム) [7%/16.7mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑩ 点滴時間 4時間	500 m L 40 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ロイコボリン注3mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ⑪ 側管より投与 点滴時間 30分 — 以下余白 —	50 m L 15 m g	