

レジメンコード030010
レジメン名称 CBDCA/VP-16 (NEC) (アロカリス)
投与間隔 21 日
備考 AUC5

病日 1 日目 ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間30分	250 m L 0 m g / A	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード030010
レジメン名称 CBDCA/VP-16 (NEC) (アロカリス)
投与間隔 21 日
備考 AUC5

病日 2 日目 ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射（D I V） 大塚糖液5% [500mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射（D I V） ラクテック注[500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	

レジメンコード 030010
レジメン名称 CBDCA/VP-16 (NEC) (アロカリス)
投与間隔 21 日
備考 AUC5

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液 100mg 「SN」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 80 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) ラクテック注 [500mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間 — 以下余白 —	500 m L	