

レジメンコード 030013

レジメン名称 AMR

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] カルセド注射用50mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 15分 — 以下余白 —	50 m L 40 m g / m ²	

レジメンコード 030013

レジメン名称 AMR

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] カルセド注射用50mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 15分 — 以下余白 —	50 m L 40 m g / m ²	

レジメンコード 030013

レジメン名称 AMR

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5%[250mL/袋] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 1時間	250 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] カルセド注射用50mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後、投与開始 点滴時間 15分 — 以下余白 —	50 m L 40 m g / m ²	