レジメンコード031011
レジメン名称　HER（継続6mg/kg）/Cap/CDDP
投与間隔　21 日
備考　ゼローダ　1000mg/㎡/回　day 1-14

病日　1 日目



| ＜薬品名・用法＞ | ＜用量＞ | ＜メモ＞ |
|---|---|---|
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「ﾀｲﾎｳ」<br>アロカリス点滴静注235mg［10mL/B］<br>デキサート注射液6.6mg［2mL/B］<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 1 袋<br>1 瓶<br>1.5 瓶 | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間　10分 | 50 ｍＬ | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>大塚生食注[250mL/袋]<br>ハーセプチン注射用150[7.2mL/150mg/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>2回目以降30分まで短縮可能<br>点滴時間　1時間30分 | 250 ｍＬ<br>6 ｍｇ/kg | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>生理食塩液バッグ「フソー」［1L/袋］<br>ＫＣＬ注20mEqｷｯﾄ｢ﾃﾙﾓ｣[1moL/20mL/筒]<br>硫酸Mg補正液1mEq/mL［20mEq/20mL/A］<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間　3時間 | 1000 ｍＬ<br>1 ｷｯﾄ<br>1 管 | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>大塚生食注［500mL/B］<br>シスプラチン点滴静注50mg｢ﾏﾙｺ｣[100mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間　2時間 | 500 ｍＬ<br>80 ｍｇ/㎡ | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>20%マンニットール注射液｢YD｣[300mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>点滴時間 1時間 | 300 ｍＬ | |

レジメンコード031011
レジメン名称　HER（継続6mg/kg）/Cap/CDDP
投与間隔　21 日
備考　ゼローダ　1000mg/㎡/回　day 1-14

病日　1　日目



| ＜薬品名・用法＞ | ＜用量＞ | ＜メモ＞ |
|---|---|---|
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑦<br>点滴時間　2時間 | 500 ｍＬ | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑧<br>点滴時間　2時間 | 500 ｍＬ | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑨<br>点滴時間　2時間<br><br>－　以下余白　－ | 500 ｍＬ | |

レジメンコード031011
レジメン名称　HER（継続6mg/kg）/Cap/CDDP
投与間隔　21 日
備考　ゼローダ　1000mg/㎡/回　day 1-14

病日　2 日目



| ＜薬品名・用法＞ | ＜用量＞ | ＜メモ＞ |
|---|---|---|
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 100 ｍＬ<br>1 瓶 | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間　2時間 | 500 ｍＬ | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間　2時間 | 500 ｍＬ | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>ＫＮ３号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間　2時間 | 500 ｍＬ | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>ＫＮ３号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間　2時間<br><br>－　以下余白　－ | 500 ｍＬ | |

レジメンコード031011
レジメン名称　HER（継続6mg/kg）/Cap/CDDP
投与間隔　21 日
備考　ゼローダ　1000mg/㎡/回　day 1-14

病日　3　日目



| ＜薬品名・用法＞ | ＜用量＞ | ＜メモ＞ |
|---|---|---|
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分 | 100 ｍＬ<br>1 瓶 | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間　2時間 | 500 ｍＬ | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間　2時間 | 500 ｍＬ | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>ＫＮ３号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間　2時間 | 500 ｍＬ | |
| 点滴注射（ＤＩＶ）<br>ＫＮ３号輸液[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間　2時間<br><br>－　以下余白　－ | 500 ｍＬ | |