

レジメンコード 031019

レジメン名称 Ramcirumab/FTD・TPI

投与間隔 28 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] サイラムザ点滴静注液500mg ○化学療法で実施 ② ■■全量を250mLとする■■ 点滴時間は2回目以降、30分に短縮可能。 点滴時間 1時間	250 m L 8 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 031019

レジメン名称 Ramcirumab/FTD・TPI

投与間隔 28 日

備考

病日 15 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] サイラムザ点滴静注液500mg ○化学療法で実施 ② ■■全量を250mLとする■■ 点滴時間は2回目以降、30分に短縮可能。 点滴時間 1時間	250 m L 8 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	