

レジメンコード 031026
 レジメン名称 RAM/CPT-11
 投与間隔 14 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タレウ」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋 1 瓶 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] サイラムザ点滴静注液500mg ○化学療法で実施 ② ■■全量を250mLとする■■ 点滴時間は2回目以降、30分に短縮可能。 点滴時間 1時間	250 m L 8 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）リノかん塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間30分	250 m L 150 m g /m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	