

レジメンコード 032035  
 レジメン名称 SOX/Cmab (継続) (アロカリス)  
 投与間隔 21 日  
 備考 S-1 80mg/m<sup>2</sup> day 1夕-15朝

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg [1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] アービタックス注射液100mg [20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エルプラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	500 m L 130 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分	50 m L	
- 以下余白 -		

レジメンコード 032035

レジメン名称 SOX/Cmab (継続) (アロカリス)

投与間隔 21 日

備考 S-1 80mg/m<sup>2</sup> day 1夕-15朝

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L	

レジメンコード 032035  
 レジメン名称 SOX/Cmab (継続) (アロカリス)  
 投与間隔 21 日  
 備考 S-1 80mg/m<sup>2</sup> day 1夕-15朝

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	100 m L 1 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m <sup>2</sup>	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間  — 以下余白 —	100 m L	