

レジメンコード 032038

レジメン名称 mFOLFOXIRI/Cmab

投与間隔 14 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶 1 管	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注 [500mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	500 m L 500 m g / m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	100 m L	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」[5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 1時間	250 m L 150 m g / m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] エルプラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ⑤ ⑥と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 85 m g / m ²	
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚糖液5%[250mL/袋] 後) レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ⑤と同時に投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 200 m g / m ²	

レジメンコード032038
レジメン名称 mFOLFOXIRI/Cmab
投与間隔 14 日
備考

病日 1 日目 ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
埋込型カテーテルによる中心静脈栄養 大塚生食注[250mL/袋] 後)フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 生食はtotalで240mL、インフューズポンプ (5mL/hr) 点滴時間 48時間 — 以下余白 —	240 m L 2400 m g /m ²	