

レジメンコード 033013
 レジメン名称 Ipi/Nivo 2week
 投与間隔 42 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] オプジーボ点滴静注240mg [24mL/V] ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ②	100 m L 240 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ヤーボイ点滴静注液50m g [10m L/瓶] ■ 希釈後の濃度1～4mg/mL ■ ■ Ipi：32mg以下の場合、1mg/mLに希釈 ■ ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	25 m L 1 m g /kg	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 033013
レジメン名称 Ipi/Nivo 2week
投与間隔 42 日
備考

病日 15 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] オブジーボ点滴静注240mg [24mL/V] ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ②	100 m L 240 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 033013
レジメン名称 Ipi/Nivo 2week
投与間隔 42 日
備考

病日 29 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射（D I V） テルモ生食[100mL/袋] オブジーボ点滴静注240mg [24mL/V] ○化学療法で実施 点滴時間 30分 ②	100 m L 240 m g	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	