

レジメンコード 033016  
 レジメン名称 FP/Nivo 4week  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/6

| <薬品名・用法>                                                                                                               | <用量>                                 | <メモ> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 2時間                                                        | 1000 m L                             |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>側管 ①と同時に投与開始<br>点滴時間 10分                                       | 50 m L                               |      |
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>オプジーボ点滴静注240mg [24mL/V]<br>○化学療法で実施<br>③<br>側管 ②終了後投与開始<br>点滴時間 30分                   | 100 m L<br>480 m g                   |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液(大塚生食注)[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>側管 ③終了後投与開始<br>点滴時間 10分                                        | 50 m L                               |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋]<br>後) フルオロウラシル注1000mg「トーワ」[20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>①終了後投与開始<br>点滴時間 22時間        | 1000 m L<br>800 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タケウ」<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>側管 ⑤と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 1 袋<br>1.5 瓶                         |      |

レジメンコード 033016  
 レジメン名称 FP/Nivo 4week  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/6

| <薬品名・用法>                                                                                                     | <用量>                               | <メモ> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>大塚生食注 [500mL/B]<br>シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」[100mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑦<br>側管 ⑥終了後投与開始<br>点滴時間 2時間   | 500 m L<br>80 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑧<br>側管 ⑦終了後投与開始<br>点滴時間 1時間                         | 300 m L                            |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>後）フロセミド注20mg「武田テバ」[2mL/A]<br>○化学療法で実施<br>⑨<br>側管 ⑧終了後投与開始<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>1 管                      |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑩<br>側管 ⑨終了後投与開始<br>点滴時間 6時間                                   | 500 m L                            |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑪<br>側管 ⑩終了後投与開始<br>点滴時間 6時間                                   | 500 m L                            |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑫<br>側管 ⑪終了後投与開始<br>点滴時間 6時間<br><br>— 以下余白 —                   | 500 m L                            |      |

レジメンコード 033016  
 レジメン名称 FP/Nivo 4week  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/6

| <薬品名・用法>                                                                                                  | <用量>                                 | <メモ> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>前日の⑤終了後、ルート交換<br>点滴時間 5分                          | 50 m L                               |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋]<br>後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」[20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 24時間        | 1000 m L<br>800 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>側管 ②と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>1 瓶                        |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>側管 ③終了後投与開始<br>点滴時間 23時間30分<br><br>— 以下余白 —            | 1500 m L                             |      |

レジメンコード 033016  
 レジメン名称 FP/Nivo 4week  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 3 日目

ページ数：4/6

| <薬品名・用法>                                                                                                  | <用量>                                 | <メモ> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>前日の②終了後、ルート交換<br>点滴時間 5分                          | 50 m L                               |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋]<br>後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」[20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 24時間        | 1000 m L<br>800 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>側管 ②と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>1 瓶                        |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>側管 ③終了後投与開始<br>点滴時間 23時間30分<br><br>— 以下余白 —            | 1500 m L                             |      |

レジメンコード 033016  
 レジメン名称 FP/Nivo 4week  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 4 日目

ページ数：5/6

| <薬品名・用法>                                                                                                  | <用量>                                 | <メモ> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>前日の②終了後、ルート交換<br>点滴時間 5分                          | 50 m L                               |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋]<br>後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」[20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 24時間        | 1000 m L<br>800 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>側管 ②と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>1 瓶                        |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>側管 ③終了後投与開始<br>点滴時間 23時間30分<br><br>— 以下余白 —            | 1500 m L                             |      |

レジメンコード 033016  
 レジメン名称 FP/Nivo 4week  
 投与間隔 28 日  
 備考

病日 5 日目

ページ数：6/6

| <薬品名・用法>                                                                                                  | <用量>                                 | <メモ> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>前日の②終了後、ルート交換<br>点滴時間 5分                          | 50 m L                               |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液バッグ「フソー」[1L/袋]<br>後）フルオロウラシル注1000mg「トーワ」[20mL/B]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 24時間        | 1000 m L<br>800 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>デキサート注射液6.6mg [2mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>側管 ②と同時に投与開始<br>点滴時間 30分 | 50 m L<br>1 瓶                        |      |
| 点滴注射（D I V）<br>ラクテック注[500mL/B]<br>○化学療法で実施<br>④<br>側管 ③終了後投与開始<br>点滴時間 23時間30分<br><br>— 以下余白 —            | 1500 m L                             |      |