

レジメンコード 034011

レジメン名称 GEM/Erlotinib

投与間隔 28 日

備考 タルセバ 100mg/day 連日投与

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用 1g 「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 mL 1000 mg/m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	100 mL	

レジメンコード 034011
レジメン名称 GEM/Erlotinib
投与間隔 28 日
備考 タルセバ 100mg/day 連日投与

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用 1g 「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	100 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 034011

レジメン名称 GEM/Erlotinib

投与間隔 28 日

備考 タルセバ 100mg/day 連日投与

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) ゲムシタピン点滴静注用 1g 「ヤクルト」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	100 m L 1000 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	100 m L	
- 以下余白 -		