

レジメンコード034019  
レジメン名称 Pembrolizumab/GEM  
投与間隔 21 日  
備考 Pembro/GC後、維持療法

病日 1 日目 ページ数：1/2

| <薬品名・用法>                                                                               | <用量>                                | <メモ> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 10分                      | 50 m L                              |      |
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>キイトルーダ点滴静注100m g [4mL/V]<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>200 m g                  |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 10分                      | 50 m L                              |      |
| 点滴注射（D I V）<br>後）グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」<br>○化学療法で実施<br>④<br>点滴時間 30分             | 1 袋                                 |      |
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」<br>○化学療法で実施<br>⑤<br>点滴時間 30分    | 100 m L<br>1000 m g /m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>⑥<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —      | 50 m L                              |      |

レジメンコード034019  
レジメン名称 Pembrolizumab/GEM  
投与間隔 21 日  
備考 Pembro/GC後、維持療法

病日 8 日目 ページ数：2/2

| <薬品名・用法>                                                                            | <用量>                                 | <メモ> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 点滴注射（D I V）<br>後）グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>点滴時間 30分            | 1 袋                                  |      |
| 点滴注射（D I V）<br>テルモ生食[100mL/袋]<br>後）ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」<br>○化学療法で実施<br>②<br>点滴時間 30分 | 100 m L<br>1000 m g / m <sup>2</sup> |      |
| 点滴注射（D I V）<br>生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B]<br>○化学療法で実施<br>③<br>点滴時間 10分<br><br>— 以下余白 —    | 50 m L                               |      |