

レジメンコード 140002
 レジメン名称 CPT-11/VCR
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] デキサメタゾン ~20kgまで 0.33~3.3mg 20~40kgまで 1.65~6.6mg 40kg~以上 1.65~8.3mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	0.04 m g /kg 3.3 m g	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ｲﾝﾌﾟﾈｶﾝ塩酸塩点滴静注液40mg 「ﾀｲﾎﾝ」[2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 50 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分 — 以下余白 —	5 m L 1.5 m g /m ²	

レジメンコード 140002
 レジメン名称 CPT-11/VCR
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 50 m g /m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140002
 レジメン名称 CPT-11/VCR
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 50 m g /m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140002
 レジメン名称 CPT-11/VCR
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 50 m g /m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140002
 レジメン名称 CPT-11/VCR
 投与間隔 21 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) イリナカン塩酸塩点滴静注液40mg 「タイホ」 [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	100 m L 50 m g /m ²	
— 以下余白 —		