

レジメンコード 140004

レジメン名称 EDP-M

投与間隔 28 日

備考 ミトタン内服：1.5g/日より増量（連日投与）

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	1000 mL/m ²	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	0.04 mg/kg 12 mg/m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注） [50mL/B] ピノルビン注射用20mg ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 1時間	50 mL 40 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140004

レジメン名称 EDP-M

投与間隔 28 日

備考 ミトタン内服：1.5g/日より増量（連日投与）

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 24時間	1500 m L / m ²	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL 「HK」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	0.04 m g / kg 12 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg「サト [®] 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 2時間	250 m L 100 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140004

レジメン名称 EDP-M

投与間隔 28 日

備考 ミトタン内服：1.5g/日より増量（連日投与）

病日 3 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① ⑤投与中（3時間）は止め 点滴時間 21時間	1500 mL/m ²	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 後）デキサート注射液 6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	0.04 mg/kg 12 mg/m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [250mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液 100mg「サト ^ド 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 2時間	250 mL 100 mg/m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 10時間45分	500 mL/m ² 20 mg/m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ①開始3時間後より投与開始（①は中断） 点滴時間 3時間	10 mL/kg	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 10時間45分	500 mL/m ² 20 mg/m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140004

レジメン名称 EDP-M

投与間隔 28 日

備考 ミトタン内服：1.5g/日より増量（連日投与）

病日 4 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） KN 3 号輸液[500mL/B] ○化学療法で実施 ① ⑤投与中（3時間）は止め 点滴時間 21時間	1500 mL/m ²	
点滴注射（D I V） 後）グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL「HK」 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 ①と同時に投与開始 点滴時間 30分	0.04 mg/kg 12 mg/m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）エトポシド点滴静注液100mg「サト ^ド 」[5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 ②終了後投与開始 点滴時間 2時間	250 mL 100 mg/m ²	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 ③終了後投与開始 点滴時間 10時間45分	500 mL/m ² 20 mg/m ²	
点滴注射（D I V） 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ ①開始3時間後より投与開始（①は中断） 点滴時間 3時間	10 mL/kg	
点滴注射（D I V） 大塚生食注 [500mL/B] 後）シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」[20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 側管 ④終了後投与開始 点滴時間 10時間45分	500 mL/m ² 20 mg/m ²	
- 以下余白 -		