

レジメンコード 140006
 レジメン名称 PEB (1歳未満)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	450 m L / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管) ①開始2時間半後より投与開始 点滴時間 10分	0.04 m g / kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] ブレオ注射用5mg ○化学療法で実施 ③ 側管) ②終了後投与開始 点滴時間 20分	20 m L 0.5 m g / kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] エトポシド点滴静注液100mg「サント」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 2時間	10 m L / kg 3 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] 硫酸Mg補正液1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ⑤ KN1号500mLと硫酸Mg補正液2mLの混合液を作成 その混合液 150mL×体表面積の量を1時間かけて投与 点滴時間 1時間	500 m L 2 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 3時間	17 m L / kg 0.7 m g / kg	

レジメンコード 140006
 レジメン名称 PEB (1歳未満)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：2/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	150 mL/m ²	
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」 [300mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 側管) ⑦と同時に投与開始 点滴時間 30分	2.5 mL/kg	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140006
 レジメン名称 PEB (1歳未満)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 2 日目

ページ数：3/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	450 m L / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管) ①開始2時間半後より投与開始 点滴時間 10分	0.04 m g / kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] エトボシド点滴静注液 100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	10 m L / kg 3 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] 硫酸Mg補正液 1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ KN1号500mLと硫酸Mg補正液2mLの混合液を作成 その混合液 150mL×体表面積の量を1時間かけて投与 点滴時間 1時間	500 m L 2 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	17 m L / kg 0.7 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	150 m L / m ²	

レジメンコード 140006
レジメン名称 PEB (1歳未満)
投与間隔 21 日
備考

病日 2 日目

ページ数：4/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管) ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	2.5 m L/kg	

レジメンコード 140006
 レジメン名称 PEB (1歳未満)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 3 日目

ページ数：5/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	450 m L / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管) ①開始2時間半後より投与開始 点滴時間 10分	0.04 m g / kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] エトポシド点滴静注液 100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	10 m L / kg 3 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] 硫酸Mg補正液 1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ KN1号500mLと硫酸Mg補正液2mLの混合液を作成 その混合液 150mL×体表面積の量を1時間かけて投与 点滴時間 1時間	500 m L 2 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	17 m L / kg 0.7 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	150 m L / m ²	

レジメンコード 140006
レジメン名称 PEB (1歳未満)
投与間隔 21 日
備考

病日 3 日目

ページ数：6/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管) ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	2.5 m L/kg	

レジメンコード 140006
 レジメン名称 PEB (1歳未満)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 4 日目

ページ数：7/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	450 m L / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管) ①開始2時間半後より投与開始 点滴時間 10分	0.04 m g / kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] エトポシド点滴静注液 100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	10 m L / kg 3 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] 硫酸Mg補正液 1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ KN1号500mLと硫酸Mg補正液2mLの混合液を作成 その混合液 150mL×体表面積の量を1時間かけて投与 点滴時間 1時間	500 m L 2 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	17 m L / kg 0.7 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	150 m L / m ²	

レジメンコード 140006
レジメン名称 PEB (1歳未満)
投与間隔 21 日
備考

病日 4 日目

ページ数：8/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管) ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	2.5 m L/kg	

レジメンコード 140006
 レジメン名称 PEB (1歳未満)
 投与間隔 21 日
 備考

病日 5 日目

ページ数：9/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 3時間	450 m L / m ²	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ② 側管) ①開始2時間半後より投与開始 点滴時間 10分	0.04 m g / kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] エトポシド点滴静注液 100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	10 m L / kg 3 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [500mL/B] 硫酸Mg補正液 1mEq/mL [20mEq/20mL/A] ○化学療法で実施 ④ KN1号500mLと硫酸Mg補正液2mLの混合液を作成 その混合液 150mL×体表面積の量を1時間かけて投与 点滴時間 1時間	500 m L 2 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 [20mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 3時間	17 m L / kg 0.7 m g / kg	
点滴注射 (D I V) KN 1 号輸液 [200mL/B] ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	150 m L / m ²	

レジメンコード 140006
レジメン名称 PEB (1歳未満)
投与間隔 21 日
備考

病日 5 日目

ページ数：10/10

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 20%マンニトール注射液「YD」[300mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 側管) ⑥と同時に投与開始 点滴時間 30分 — 以下余白 —	2.5 m L/kg	