

レジメンコード 050001

レジメン名称 CARE

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 1時間	100 m L 450 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液100mg「サト ^ド 」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 点滴時間 2時間	250 m L 150 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 5分	10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注 ^{ハック} 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ⑤ 側管 ①投与開始12時間後 点滴時間 30分 — 以下余白 —	0.04 m g /kg	

レジメンコード 050001

レジメン名称 CARE

投与間隔 21 日

備考

病日 2 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液 100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 2時間	250 m L 150 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 点滴時間 5分	10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ 側管 ①投与開始12時間後 点滴時間 30分 — 以下余白 —	0.04 m g /kg	

レジメンコード 050001

レジメン名称 CARE

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注 [250mL/袋] 後) エトポシド点滴静注液 100mg「サト」 [5mL/B] ○化学療法で実施 ② 側管 点滴時間 2時間	250 m L 150 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液 (大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 側管 点滴時間 5分	10 m L	
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ④ 側管 ①投与開始12時間後 点滴時間 30分 — 以下余白 —	0.04 m g /kg	