

レジメンコード 054004  
 レジメン名称 EE-4A (AV1) 1歳以上  
 投与間隔 21 日  
 備考 week 12、15、18

病日 1 日目

ページ数：1/1

| <薬品名・用法>                                                                                                                                                        | <用量>                    | <メモ> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 点滴注射 (D I V)<br>後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」<br>○化学療法で実施<br>①<br>側管<br>点滴時間 30分                                                                              | 0.04 m g /kg            |      |
| 静脈内注射 (I V) [外来]<br>オンコビン注射用1mg<br>生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>②<br>側管<br>オンコビン1mg/Vを生食10mLで溶解、<br>必要量を採取して供給<br>緩徐に静注                                 | 0.067 m g /kg<br>10 m L |      |
| 静脈内注射 (I V) [外来]<br>コスメゲン0.5mg<br>生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A]<br>○化学療法で実施<br>③<br>側管<br>コスメゲン0.5mg/Vを注射用水1.1mLで溶解、<br>必要量を採取、生食10mLを加えて供給<br>点滴時間 30分<br><br>— 以下余白 — | 0.045 m g /kg<br>10 m L |      |