

レジメンコード 055206

レジメン名称 SIOP WT2001 AVD (AVD) 体重5-12kg

投与間隔 7 日

備考 week 2、8、14、20、26

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 側管 点滴時間 30分	0.04 m g /kg	
静脈内注射 (I V) [外来] オンコビン注射用1mg 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ○化学療法で実施 ② 側管 オンコビン1mg/Vを生食10mLで溶解、 必要量を採取して供給 緩徐に静注	0.05 m g /kg 10 m L	
静脈内注射 (I V) [外来] コスメゲン0.5mg 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] ○化学療法で実施 ③ 側管 コスメゲン0.5mg/Vを注射用水1.1mLで溶解、 必要量を採取、生食10mLを加えて供給 点滴時間 30分	0.03 m g /kg 10 m L	
静脈内注射 (I V) [外来] 後) ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 テルモ生食[100mL/袋] ○化学療法で実施 ④ 側管 点滴時間 6時間 — 以下余白 —	1.66 m g /kg 100 m L	