

レジメンコード130031

レジメン名称 PCE (IC) (250mg/m²) (継続)

投与間隔 7 日

備考 導入含め全8コース

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 2 瓶 1 管	
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ■Cmab投与終了後60分は経過観察■ ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] 後) ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 80 m g / m ²	

レジメンコード130031

レジメン名称 PCE (IC) (250mg/m²) (継続)

投与間隔 7 日

備考 導入含め全8コース

病日 1 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液150mg {NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	