

レジメンコード130033

レジメン名称 PCE（緩和）（250mg/m²）（継続）

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 2 瓶 1 管	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ■Cmab投与終了後60分は経過観察■ ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 100 m g / m ²	

レジメンコード130033

レジメン名称 PCE（緩和）（250mg/m²）（継続）

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード130033

レジメン名称 PCE（緩和）（250mg/m²）（継続）

投与間隔 21 日

備考

病日 8 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 2 瓶 1 管	
点滴注射（D I V） 後）パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイワ」 ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ■Cmab投与終了後60分は経過観察■ ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）ファモチジン注射用20mg「タカタ」 ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	50 m L 1 管	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」 ○化学療法で実施 ⑥ 点滴時間 1時間	250 m L 100 m g / m ²	

レジメンコード130033

レジメン名称 PCE（緩和）（250mg/m²）（継続）

投与間隔 21 日

備考

病日 8 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] 後）カルボプラチン点滴静注液150mg{NK} [15mL/B] ○化学療法で実施 ⑦ 点滴時間 1時間	250 m L 0 m g /A	
点滴注射（D I V） 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑧ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード130033

レジメン名称 PCE（緩和）（250mg/m²）（継続）

投与間隔 21 日

備考

病日 15 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] 後）デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ポララミン注5mg[1mL/A] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L 2 瓶 1 管	
点滴注射（D I V） 大塚生食注[250mL/袋] アービタックス注射液100mg[20mL/B] ■Cmab投与終了後60分は経過観察■ ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 250 m g / m ²	
点滴注射（D I V） 生理食塩液（大塚生食注）[50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	