**獨協医科大学病院　化学療法レジメン**

レジメン名　G-Bendamustine

レジメン番号　005061　　1コースの日数　28

レジメン内容

| 内服コメント | ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ day1 併用、total 6ｻｲｸﾙ |
|---|---|

| No. | 薬剤名<br>(溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day<br>1 | 2 | 3 | 28<br>休 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>ソル･コーテフ注射用１００mg〔100mg/瓶〕<br>ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕 | 50mL<br>100mg<br>1A | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注〔250mL/袋〕<br>ガザイバ点滴静注１０００mg〔1000mg/40mL〕 | 210mL<br>1000mg | 点滴注射（ＤＩＶ） | | インラインフィルター使用<br>速度は指示簿、メモ参照 | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50mL | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| 1 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>グラニセトロン静注液３mg｢ｻﾜｲ｣〔3mg/3mL〕<br>デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕 | 50mL<br>3mg<br>6.6mg | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | | ○ | ○ | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注〔250mL/袋〕<br>注射用水〔100mL/瓶〕<br>トレアキシン点滴静注用 | 250mL<br>100mL<br>90mg/㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 1時間 | トレアキシン用量分の生食を抜き<br>最終量を250mLとする | | ○ | ○ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |