**獨協医科大学病院　化学療法レジメン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | 外来　R-THPCOP　70歳代 | | |
| レジメン番号 | 005113 | 1コースの日数 | 21 |

レジメン内容

| 内服コメント | PSL 40mg/m2 day2-6 内服併用 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 薬剤名<br>(溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 21<br>休 | | | | | | | |
| 1 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 | 100m L | 点滴注射（ＤＩＶ） | | ルートキープ用 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>ソル･コーテフ注射用１００mg〔100mg/瓶〕<br>ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕 | 50m L<br>100m g<br>1 A | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注〔500mL/袋〕<br>リツキシマブBS点滴静注｢KHK｣ | 337.5m L /㎡<br>375m g /㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | | リツキシマブBS9倍量の生食で希釈<br>2回目以降、100mL/hr（1hr）で開始→200mL/hr | ○ | | | | | | | | | |
| 4 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | ○ | | | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>グラニセトロン静注液３mg｢ｻﾜｲ｣〔3mg/3mL〕 | 50m L<br>1 A | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | | ○ | | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>テラルビシン注射用10mg〔10mg/瓶〕 | 50m L<br>40m g /㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | | ○ | | | | | | | | |
| 4 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>オンコビン注射用１mg〔1mg/瓶〕 | 50m L<br>1.4m g /㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 10分 | | | ○ | | | | | | | | |
| 5 | 大塚生食注〔500mL/袋〕<br>注射用エンドキサン | 500m L<br>650m g /㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 2時間 | | | ○ | | | | | | | | |
| 6 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕 | 50m L | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | | ○ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |