**獨協医科大学病院　化学療法レジメン**

| | | | |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | 外来　A+AVD | | |
| レジメン番号 | 005138 | 1コースの日数 | 28 |

レジメン内容

| 内服コメント | 最大6ｻｲｸﾙ |
|---|---|

| No. | 薬剤名<br>(溶解液等含む) | 標準的投与量 | 投与方法 | 投与時間 | コメント | Day 1 | 15 | 28<br>休 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 | 100ｍＬ | 点滴注射（ＤＩＶ） | | ルートキープ用 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>グラニセトロン静注液３mg｢ｻﾜｲ｣〔3mg/3mL〕<br>デカドロン注射液６．６mg〔2mL/瓶〕 | 50ｍＬ<br>3ｍｇ<br>6.6ｍｇ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕<br>注射用水ＰＬ「ﾌｿｰ」〔20mL/Ａ〕<br>アドセトリス点滴静注用５０mg | 100ｍＬ<br>40ｍＬ<br>1.2ｍｇ/㎏ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 30分 | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 4 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>ドキソルビシン塩酸塩注射用 | 50ｍＬ<br>25ｍｇ/㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 15分 | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 5 | 大塚生食注〔50mL/瓶〕<br>エクザール注射用１０mg〔10mg/瓶〕 | 50ｍＬ<br>6ｍｇ/㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 10分 | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 6 | 大塚生食注〔500mL/袋〕<br>注射用水〔100mL/瓶〕<br>ダカルバジン注用１００〔100mg/瓶〕 | 500ｍＬ<br>100ｍＬ<br>375ｍｇ/㎡ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 3時間 | 遮光（ルートも遮光） | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 7 | 大塚生食注〔500mL/袋〕 | 500ｍＬ | 点滴注射（ＤＩＶ） | 注入時間 3時間 | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |