獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	外来　GDP		
レジメン番号	005161	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠4mg 40mg/body（6-4-0） day1-4 内服併用															
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day										
						1	8	21 休								
1	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕	100ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○	○									
2	大塚生食注〔500mL/袋〕 ＫＣＬ注２０mEqｷｯﾄ〔20mL/ｷｯﾄ〕 硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL〔20mL/A〕	500ｍL 10ｍL 10ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○										
3	大塚生食注〔500mL/袋〕 ＫＣＬ注２０mEqｷｯﾄ〔20mL/ｷｯﾄ〕 硫酸Ｍｇ補正液１mEq/mL〔20mL/A〕	500ｍL 10ｍL 10ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間		○										
4	大塚生食注〔500mL/袋〕	500ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 4時間		○										
5	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg｢ｻﾜｲ｣〔3mg/3mL〕	50ｍL 3ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	側管	○										
6	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100ｍL 1000ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分	側管	○										
7	２０％マンニットール注射液｢YD｣〔300mL/袋〕	300ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	側管	○										
8	大塚生食注〔500mL/袋〕 シスプラチン点滴静注	500ｍL 75ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	調製後全量700mL以上となる場合、適宜生食を抜き調製 側管	○										
9	大塚生食注〔50mL/瓶〕 ラシックス注２０mg〔20mg/2mL〕	50ｍL 20ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 10分	側管	○										
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg｢ｻﾜｲ｣〔3mg/3mL〕	50ｍL 3ｍg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○									
3	生理食塩液｢ﾋｶﾘ｣〔100mL/瓶〕 ゲムシタビン点滴静注用	100ｍL 1000ｍg/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○									
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍL	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分			○									