獨協医科大学病院　化学療法レジメン

レジメン名	外来　PBR　3日間		
レジメン番号	005217	1コースの日数	21

レジメン内容

内服コメント	最大6ｻｲｸﾙ														
No.	薬剤名 (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day									
						1	2	3	21 休						
1	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）		ルートキープ用	○	○	○							
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 ソル･コーテフ注射用１００mg〔100mg/瓶〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	50ｍＬ 100ｍｇ 1Ａ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分		○									
3	大塚生食注〔500mL/袋〕 リツキシマブBS点滴静注「KHK」	337.5ｍＬ/㎡ 375ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）		リツキシマブBS9倍量の生食で希釈 2回目以降、100mL/hr（1hr）で 開始→200mL/hr	○									
4	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分		○		○							
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg「ｻﾜｲ」〔3mg/3mL〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕 ネオレスタール注射液１０mg〔10mg/1mL〕	50ｍＬ 3ｍｇ 6.6ｍｇ 1Ａ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○								
3	光糖液５％〔100mL/瓶〕 注射用水ＰＬ「ﾌｿｰ」〔20mL/Ａ〕 ポライビー点滴静注用３０mg〔30mg/瓶〕	100ｍＬ 20ｍＬ 1.8ｍｇ/kg	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間30分	インラインフィルター使用 初回90分、2回目以降30分 投与終了後30分経過観察		○								
4	生理食塩液「ﾋｶﾘ」〔100mL/瓶〕	100ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分			○								
5	大塚生食注〔250mL/袋〕 注射用水〔100mL/瓶〕 トレアキシン点滴静注用	250ｍＬ 100ｍＬ 90ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	トレアキシン用量分の生食を抜き最 終量を250mLとする		○								
6	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50ｍＬ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 15分			○								
2	大塚生食注〔50mL/瓶〕 グラニセトロン静注液３mg「ｻﾜｲ」〔3mg/3mL〕 デカドロン注射液６.６mg〔2mL/瓶〕	50ｍＬ 3ｍｇ 6.6ｍｇ	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 30分				○							
3	大塚生食注〔250mL/袋〕 注射用水〔100mL/瓶〕 トレアキシン点滴静注用	250ｍＬ 100ｍＬ 90ｍｇ/㎡	点滴注射（ＤＩＶ）	注入時間 1時間	トレアキシン用量分の生食を抜き最 終量を250mLとする			○							