## 獨協医科大学病院 化学療法レジメン

レジメン名 外来 PBR 2日間

レジメン番号 005218 1コースの日数 21

## レジメン内容

内服コメント 最大6サイクル														
No.	薬剤名 ・ (溶解液等含む)	標準的投与量	投与方法	投与時間	コメント	Day								
						1	2	21 休						
1	生理食塩液「ヒカリ」〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射(DIV)		ルートキープ用	0	0							
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射(DIV)	注入時間 30分		0								
	グラニセトロン静注液 3 mg「サワイ」〔3mg/3mL〕	3m g												
	ソル·コーテフ注射用100mg〔100mg/瓶〕	100m g												
2	ネオレスタール注射液 1 0 mg〔10mg/1mL〕	1 A												
	大塚生食注〔500mL/袋〕	337.5m L/mੈ			リツキシマブBS9倍量の生食で希									
	リツキシマブBS点滴静注「KHK」	375m g /㎡			釈	o ا								
					2回目以降、100mL/hr(1hr)で									
3					開始→200mL/hr									
	光糖液 5 %〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射(DIV)	注入時間 30分	インラインフィルター使用 投与終了後30分経過観察									
	注射用水 P L 「フソー」 〔20mL/A〕	20m L				0								
4	ポライビー点滴静注用 3 0 mg〔30mg/瓶〕	1.8m g /kg												
5	生理食塩液「ヒカリ」〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射(DIV)	注入時間 30分		0								
	大塚生食注〔250mL/袋〕	250m L			トレアキシン用量分の生食を抜き 最終量を250mLとする									
	注射用水〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射(DIV)	注入時間 1時間		$\circ$								
6	トレアキシン点滴静注用	90m g /㎡												
7	生理食塩液「ヒカリ」〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射(DIV)	注入時間 15分		0								
	大塚生食注〔50mL/瓶〕	50m L	点滴注射(DIV)	注入時間 30分										
	グラニセトロン静注液 3 mg「サワイ」(3mg/3mL)	3m g					$\circ$							
2	デカドロン注射液 6 . 6 mg〔2mL/瓶〕	6.6m g												
	大塚生食注〔250mL/袋〕	250m L		注入時間 1時間	トレアキシン用量分の生食を抜き 最終量を250mLとする									
	注射用水〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射(DIV)				$\circ$							
3	トレアキシン点滴静注用	90m g /㎡												
4	生理食塩液「ヒカリ」〔100mL/瓶〕	100m L	点滴注射(DIV)	注入時間 15分			0							